


Dr. Stefan Hutter Grosstierpraxis

Thalacker 9 Tel. 031 762 07 77
 3303 Zuzwil Fax 031 762 07 78


Medikamentenverzeichnis Grosstiere (mit Absetzfristen)

Medikament	Absetzfrist Milch	Absetzfrist Fleisch	Anwendung
Advocid 18%	4 Tage	Kalb: 8 Tage Rinder/Kühe: 3 Tage	Gelenksentzündungen, Durchfall, Lungenentzündung
Aluban-Spray	Keine	Keine	Wundbehandlung
Atussin-Sirup	Keine	Keine	Atemwegserkrankungen
Aurofac	Nicht anwenden	Schweine: Fleisch: 10 Tage Leber: 15 Tage Niere: 25 Tage	Lungenerkrankungen, PIA
Baycox 5%	Nicht anwenden	Kälber: 63 Tage Ferkel: 70 Tage Lämmer: 42 Tage Kaninchen: 35 Tage	Kokzidiose
Baytril 10%	4 Tage	7 Tage (Rind&Schwein)	Schwein: MMA, Durchfallerkrankungen Rind: Atemwegs- erkrankungen, Coliviertel
Baytril 0,5 % Doser	Nicht anwenden	5 Tage	Durchfallerkrankungen
Benamin Sirup ohne Codein	Nicht anwenden	6 Monate	Husten
Betadine Lösung und Seife	Keine	Keine	Wundbehandlung, Desinfektion
Bi-Pill	Keine	Keine	Durchfall (Acidose), Pansentrinker
Bisolvon Lösung	Keine	Keine	Atemwegsinfektionen
Bitumol 20%	Keine	Keine	Entzündungen, be- ginnende Abszendierung
Bovicalc Bolus	Keine	Keine	Festliegeprophylaxe
Bovicalc P Bolus	Keine	Keine	Phosphormangel (Prophylaxe)
Bovilis Bovigrip	Keine	Keine	Impfung Lungen- entzündung
Bovilis Ringvac	Keine	Keine	Flechtenbefall
Bovisal Pearls	Keine	Keine	Festliegeprophylaxe
Buscopan compositum	4 Tage	Pferd: 9 Tage Rd/Kalb: 15 Tg nach einem Inj., sonst 18Tge Schwein: 20 Tage	Schlundverstopfung, Kolik

Inj. St= Injektionsstelle,; einm. Inj.= einmalige Injektion; Tg/Tge= Tage; Rd= Rind; Schf= Schaf; Zge= Ziege;
 Schw= Schwein

Butox 7.5%	Keine	Keine	Insektizid gegen Fliegen und Bremsen
Calcitad N25	Keine	Keine	MMA, Wehenschwäche
Calcitad S 50	Keine	Keine	MMA, Wehenschwäche
Catosal 10%	Keine	Keine	Anregung des Stoffwechsels
Chlor-Tetracyclin-Spray	Keine	Keine	Wundbehandlung, Grippeli
Chorulon 1500 I.E	Keine	Keine	Verbesserung der Konzeptionsrate bei Belegung
Circoflex		Keine	Impfstoff (Porcines Circovirus)
Clostricol		Keine	Impfstoff (E.coli, Clostridium perfringens Typ C)
Clostriporc A		Keine	Impfstoff (Clostridium perfringens Typ A)
Cloxa-Coli Injektor	5 Tage	3 Tage	Euterentzündungen (Coli-Viertel)
Cobactan 2.5%	1 Tage	Rind: 5 Tage Schwein: 3 Tage	Atemwegsinfekt, Mastitis, MMA
Cobactan LC Mastitisinj.	5 Tage	4 Tage	Euterentzündungen
Cobiotic	3 Tage	Fleisch, Leber: 3 Tg Niere: 8 Tg (Rd,Schw) 14 Tg (Pfd, Schaf)	Infektionen
Colivet		Ferkel: 3 Tage	Therapie Colidurchfall
Collodium 6%	Keine	Keine	Zitzen versiegeln
Cysectin 0.1% (Schafe)	5 Tage	7 Tage	Parasitenbekämpfung
Cysectin 0.5 pour on	0 Tage	14 Tage	Parasitenbekämpfung
Cyclosol LA	4 Tage	Fleisch:14 Tage Inj. St: 21 Tage	Infektionen (Prophylaxe und Therapie)
Dectomax	Nicht anwenden	Rind: 42 Tage Schaf: 35 Tage Schwein: 49 Tage	Parasitenbekämpfung
Degravit	Keine	Keine	Vitamin A,D, E Mangel
Dexadreson	3.5 Tage	Rind: 8 Tage Pferd: 5 Tage Schwein: 2 Tage	MMA, Gelenkentzündungen, E.coli-Toxämie, Ketose,.
Diaproof K	Keine	Keine	Durchfall
Dimazon	1 Tage	1 Tag	Euterödem
Dinolytic	Keine	Keine	Geburtseinleitung, Brunsteinleitung
Dolovet	0 Tage	1 Tag	Schmerz- und Entzündungszustände

Inj. St= Injektionsstelle,; einm. Inj.= einmalige Injektion; Tg/Tge= Tage; Rd= Rind; Schf= Schaf; Zge= Ziege; Schw= Schwein

Doxivit	Nicht anwenden	Kälber: 14 Tage Schwein: 10 Tage	Infektionen des Atemapparates
Draxxin 10%	Nicht anwenden	Rind: 49 Tage Schwein: 33 Tage	Atemwegserkrankungen
Duphamox	3 Tage	21 Tage	Bakterielle Infektionen
E-Pill	Keine	Keine	Energiemangel, Ketose
Eazy-Breed CIDR Spiralen	Keine	Keine	Sterilität
Endex 8.75%	7 Tage (Schafe)	28 Tage (Schafe)	Entwurmung, Leberegelbefall
Engemycin 10%	3 Tage	Fleisch: 10 Tage Inj. St.:14 Tage	Bakterielle Infektionen
Enteran		Fleisch: Schw.,Schaf: 3 Tage Kalb: 5 Tage Nieren: 7 Tage	Durchfallerkrankungen
Enterisol Ileitis		Keine	Impstoff (Lawsonien intracellularis)
Eprinex Pour-On	0 Tage	0 Tage; Ziege:15 Tage	Parasitenbekämpfung
Equest Pramox		Pferd: 64 Tage	Magen-Darmparasiten
Equimax Wurmpaste		Pferd: 30 Tage	Magen-Darmparasiten
Equipalazone Pulver&Paste		Pferd: 6 Monate	Entzündungen des Bewegungsapparates
Eraquell		Pferd: 14 Tage	Magen-Darmparasiten
Ferriphor 20%	Keine	Keine	Eisenversorgung
Fertagyl	Keine	Keine	Fruchtbarkeitsstörungen
Finadine 5%	3 Tage	5 Tage (Pfd, Rd) 18 Tage (Schwein)	Kolik, Schmerzen/Entzündung des Bewegungsapparates
Flubenol 5%		5Tage (Schwein) 3 Tage Huhn, Eier: keine	Entwurmung
Flunixin	3 Tage	5 Tage (Pfd, Rd) 18 Tage (Schwein)	Lahmheit, Mastitis, Lungenentzündung, Kolik
Folligon 5x1000 I.E.	Keine	Keine	Brunstlosigkeit, Brunstauslösung
FolliPlan		Schwein: 24 Tage	Brunstsynchronisation
Genabil	Keine	Keine	Störung der Verdauung
Genestran	1 Gemelk	1 Tag	Rauscheinduktion, Geburtseinleitung
Gentaseptin-Metrinjektor	3 Tage	5 Tage	Gebärmutterentzündung
Globus Spezial	Keine	Keine	Entblähung
Halocur	Nicht anwenden	13 Tage	Cryptosporidienprophylaxe und behandlung
Hapadex 5%	5 Tage (Schafe)	Fleisch: 5 Tage Leber: 20 Tage	Entwurmung
Hapadex 15%	5 Tage (Rinder)	Fleisch: 5 Tage Leber: 20 Tage	Entwurmung
Imaverol	Keine	Keine	Hautpilzkrankungen

Inj. St= Injektionsstelle,; einm. Inj.= einmalige Injektion; Tg/Tge= Tage; Rd= Rind; Schf= Schaf; Zge= Ziege; Schw= Schwein

Improvac		Keine	Impfung zur Vermeidung von Ebergeruch
Inorgan		0,5 Tage	Durchfall
Insol Trichophyton		3 Tage	Flechten (Trichophytie)
Intertocine-S	Keine	Keine	MMA, Wehenunterstützung, Milchflussstörung
Isoflo		Pferd/Ferkel: 2 Tage	Inhalationsnarkose
Jonovit	Keine	Keine	Durchfall, Verdauungsstörung
Kanamastine 400	18 Tage	18 Tage	Mastitis
Konstigmin	Keine	Keine	Verdauungsstörung, Darmentleerung
Lidocain 2%	1 Tag	1 Tag	Lokalanästhesie
Lincocin Neo intramammär	6 Tage	3 Tage	Mastitis
Linco-Spectin		Schwein: 14 Tage	Infektionen (Dysenterie, Rotlauf,...)
Linco Spectin Premix		Schwein: 3 Tage	Therapie und Methaphylaxe Dysenterie, PIA
Long Acton	Keine	Keine	Wehenschwäche, MMA
Lokatim plus	Keine	Keine	Prophylaxe und Therapie bei Coli, Rota-, Coronavirus Infektionen
Lokatim	Keine	Keine	Prophylaxe und Therapie bei Coli, Rota-, Coronavirus Infektionen
Lorasol	Keine	Keine	Prophylaxe von Eutererkrankungen
Magnesiumstäbe	Keine	Keine	Magnesiummangel
Mammamint	Keine	Keine	Euterentzündungen
Mamycin 5Mio/10 Mio	4 Tage	10 Tage	Mastitis
Mederantil	Keine	Keine	Appetit-Stimulans
Metricure	Keine	24Std.	Gebärmutterentzündung (leichte)
Metacam	5 Tage	Rind: 15 Tage Schwein, Pferd: 5 Tage	Schmerz- und Entzündungshemmend
Micotil	Nicht anwenden	Rind: 28 Tage	Lungenentzündung, Otitis
Nafpenzal	3 Gemelke bei Gustzeit von 6 Wochen	Rind: 2 Wochen Schaf/Ziege: 3 Wochen	Zum Trockenstellen
Naquadem	1 Tage	5 Tage	Euterödem
Narketan	0 Tage	1 Tag	Kurzsnarkose
Naxcel Rind (200mg)	0 Tage	9 Tage (nur bei Applikation in Ohrwurzel)	Grippeli, Infektionen
Naxcel Schwein (100mg)		71 Tage	Streptokokkeninfektion
Neo-M-Salbe -forte Injektor	5 Tage	5 Tage	Mastitis

Inj. St= Injektionsstelle,; einm. Inj.= einmalige Injektion; Tg/Tge= Tage; Rd= Rind; Schf= Schaf; Zge= Ziege;
Schw= Schwein

Neo-M -Salbe	5 Tage	5 Tage	Mastitis
Neo-M-Suspension	5 Tage	5 Tage	Mastitis, Metritis
Neopredisan	Nicht anwenden	direkt am Tier!!!	Desinfektionsmittel
Noromectin	Nicht anwenden	28 Tage (Rind,Kalb)	Parasitenbekämpfung
Novaderma	1 Tag	1 Tag	Klauen und Hauterkrankungen
Omasin	Keine	Keine	Verdauungsstörung
Orbenin Extra Dry-Cow	7 Wochen	7 Wochen	Trockensteller
Orbesael	Keine	Keine	Zitzenverschluss in Gustzeit
Oxytocin	Keine	Keine	Wehenschwäche, Milchabflussstörungen
Panacur-Boli für Schafe (250mg)	6 Tage	Leber: 21 Tage Fleisch: 14 Tage	Entwurmung
Panacur-Boli für Rinder	Nicht anwenden	200 Tage	Entwurmung
Panacur Paste für Pferde		5 Tage	Entwurmung
Permammas	Keine	Keine	Mastitis, lokale Entzündungen
P.G.600	Keine	Keine	Anöstrus, Hormonregulation
Phlogal-Salbe	Nach Anwendung am Euter 3 Tage	Keine	Gelenksentzündungen, Gesäugeentzündungen
Porcilis Coli Clos		Keine	Impfstoff (E.coli, Clostridium perfringens Typ C)
Porcilis Ery+Parvo		Keine	Impfstoff (Rotlauf, Porcine Parvovirose)
Porcilis Porcoli DF		Keine	Impfstoff (E.coli)
Progesteron 25mg	Keine	7 Tage	Cysten, drohender Abort
R-3 Durchfallpulver	3 Tage	4 Tage	Infektiöser Durchfall
Receptal	Keine	Keine	Fruchtbarkeitsstörungen (Rind)
Resflor	Nicht anwenden	46 Tage	Atemwegsinfektionen
Respirot		5 Tage	Atemstimulans (Kalb)
Rimadyl	0 Tage	21 Tage	Mastitis, Atemwegserkrankungen
Rompun 2%	Rind: 0 Tage	1 Tag (Rind&Pferd)	Sedation (in Kombination mit Lokalanästhesie)
Rota-TS Oraldoser		Pferd: 6 Tage	Bakterielle Infektion
Rota-TS Pulver	3 Tage	7 Tage	Infektionen
Rudigest Antacid	Keine	Keine	Verdauungsstörung, Pansenübersäuerung
Sano-Vital	Keine	Keine	Eisenmangel
S-Pill	Keine	Keine	Verdauungsstörung
Sebacil 50%	Kuh: 7 Tage	Rind: 4 Wochen Schwein: 2 Wochen Schaf: 6 Wochen	Ektoparasiten

Inj. St= Injektionsstelle,; einm. Inj.= einmalige Injektion; Tg/Tge= Tage; Rd= Rind; Schf= Schaf; Zge= Ziege;
Schw= Schwein

Sedalin Gel-Oraldoser		6 Monate (Pferd)	Sedation
Selen-E-Vetag	Keine	Keine	Selenmangel
Scourgard 3	Keine	Keine	Mutterschutzimpfung (E.coli, Corona-, Rotavirus)
Starke grüne Salbe	Bei Anwendung am Euter: 3 Tage	Keine	Mastitis, Gelenk-und Muskelleiden, Arthritis, Hämatome, Abszesse
Stresnil		7 Tage (Schwein)	Sedation
Stullmisan S	Keine	Keine	Durchfall
Suanovil 20%	12 Tage	Rind: Fleisch und Organe:21 Tage , Schwein: Fleisch: 7 Tage; Organe: 21 Tage; Inj.St. verwerfen	Infektionen
Super Mastitar	5 Wochen	28 Tage	Trockensteller
Synulox LC Plus	84 Stunden	7 Tage	Mastitis
Synulox Suspension	3 Tage	Rind: 28 Tage Schwein: 19 Tage	Pneumonie, Mastitis
Tetrabiotic-Stäbe	3 Tage	7 Tage	Gebärmutterentzündung
Totalin	Keine	Keine	Mangelercheinungen, Aufzuchtkrankheiten
Trimethazol	3 Tage	Fleisch:3 Tage Inj.St., Niere, Leber: 5Tage	MMA; Magen- Darminfektion,...
Truleva RTU	0 Tage	Rind: 8 Tage Schwein: 5 Tage	Infektionen d. Atemwege, Metritis, Panaritium,...
Tylan 200	3 Tage	Schwein: 3 Tage Rind: 7 Tage Injst.: 21 Tage	Gelenkentzündungen
Ubrolexin	5 Tage	10 Tage	Euterentzündungen
Ufa Amoxan	Nicht anwenden	6 Tage	Lungenentzündungen (Medizinierung über Milch)
Ufa Spixan	Nicht anwenden	Kälber/Schweine: Fleisch: 15 Tage Organe: 24 Tage	Therapie und Metaphylaxe bakterieller Mischinfektionen
Utrorale	Keine	Keine	Uterustonicum (lokale Anwendung)
Vagizan	Keine	Keine	Schenkelfaltendermatitis
Ventipulmin Lsg. u. Granulat	Nicht anwenden	28 Tage	Atembeschwerden, RAO
Venti Plus	Nicht anwenden	28 Tage	Bronchopneumonie, RAO
Vetalgin	2 Tage	Rind: 12 Tage Schwein: 3 Tage Pferd: 5 Tage	Schmerzmittel, Kolik

Inj. St= Injektionsstelle,; einm. Inj.= einmalige Injektion; Tg/Tge= Tage; Rd= Rind; Schf= Schaf; Zge= Ziege;
Schw= Schwein

Vetagent	3 Tage	Pferd: Fleisch, Leber: 7 Tage Inj. St: 14 Tage Niere: 45 Tage Rd/Schf/Zge/Schw: Fleisch, Leber: 5 Tage Niere, Inj. St: 45 Tage	Infektionen
Vinx		Keine	Ektoparasitosen
Vetisept-Uterusstäbe	Keine	Keine	Gebärmutterentzündung
Vital CST-222 L	Nicht anwenden	Schwein/Kalb: 20 Tage	Bakterielle Misch- infektionen, PIA, Gelenkentzündungen
Vital TSS	Nicht anwenden	10 Tage	HPS, Atemwegsinfektionen
Vital-Colistin 500	Nicht anwenden	2 Tage	Coli-Durchfall, Oedemkrankheit
Vitamin D3	Keine	Keine	Festliegenprophylaxe
Westolyt- Pulver	Keine	Keine	Flüssigkeitsersatz (bei Durchfall)
Zolvix	Nicht anwenden	7 Tage	Entwurmung